

| | 項目 | 完成 (v 或 x) |
|-------------|--|------------|
| 無菌操作及姿勢 | 打開 CD 罐是否正確 | |
| | CD 罐內耗材的取用是否正確 | |
| | 泡鑷夾的使用是否正確 | |
| | 正確開啟無菌包裝 | |
| | 操作時坐姿及打燈方向正確 | |
| | 能正確操作治療椅 | |
| | 戴手套進行臨床操作時，不污染工作環境 | |
| 下齒槽神經及舌神經麻醉 | 會檢測 3M Pluraject™ 2 麻槍功能是否正常 | |
| | 安裝麻藥正確，包括能正確將 Harpoon 卡住麻藥管 | |
| | 正確口述 Indirect technique 流程，包括舌神經阻斷的流程 | |
| | 進針前取用適當大小的 BI 棉球做表面消毒 | |
| | 能用拇指或食指將軟組織繃緊並觸摸到 Internal oblique ridge | |
| | 手持麻槍動作正確，且進針前操作手的拇指不會施加力量使麻藥滴出 | |
| | 進針到下齒槽神經目標區後能回抽 | |
| | 回抽有血時針能稍微回退後左右移動再次回抽確認 | |
| | 下齒槽神經施打 3/4 管麻藥 | |
| | 正確到舌神經目標區後能回抽，將剩下的麻藥打完 | |
| | 推藥速度一管約一分鐘 | |
| | 能口述麻醉相對應的區域 | |
| 正確執行麻醉測試 | | |
| 拆卸尖銳物 | 以 Scoop technique 將針套回 | |
| | 病人回復原始姿勢並能推開治療台讓患者起身 | |
| | 卸下針後針蓋不回蓋 | |
| | 麻藥管丟在回收桶中 | |
| | 其餘醫療廢棄物正確丟棄 | |
| 合計 | 23~25 : A | |
| | 20~22 : B | |
| | 17~19 : C | |
| | 14~16 : D | |
| | <13 : E | |

指導老師：